



Schulzahnärztlicher Dienst

perchè si devono far curare i danni ai denti (buchi)

In molti casi, i denti cariati (guasti) sono riconoscibili soltanto dal dentista, spesso in collegamento con radiografie. Quando il profano vede il „bucò“, spesso è già troppo tardi. Per questa ragione, si consiglia di sottoporsi ad un controllo dentistico almeno 1 x l'anno.

Gesundheitsdepartement
Davidstrasse 27
9001 St.Gallen
T 058 229 43 82
F 058 229 35 52
gesundheitsvorsorge@sg.ch
www.gesundheit.sg.ch

Conseguenze della trascuratezza nella cura dei denti:

Denti da latte

- I denti da latte distrutti possono causare forti dolori, che eventualmente disturbano fortemente la qualità della vita (insonnia ecc.).
- I denti da latte distrutti possono causare gravi **ascessi** (pus), con febbre ed addirittura eventuali **danni** ad altri **organi**. In parte può essere necessario un ricovero in ospedale ed in casi estremi può subentrare una situazione di pericolo vitale.
- Alla perdita precoce dei denti da latte seguono **disturbi della crescita ossea** della mandibola. I denti limitrofi si spostano nello spazio, cosa che rende impossibile l'eruzione dei denti rimanenti. In seguito, sono necessari **interventi chirurgici** o **trattamenti ortodontici** dispendiosi (anelli dentari) che hanno costi molto elevati.

Denti definitivi

- Per impedire la formazione di „buchi“, si può **sigillare** la superficie di masticazione.
- **Più piccolo** è il „bucò“, **più facile** e **più economico** è ripararlo. Così il dente si può conservare per un tempo maggiore.
- Se si aspetta troppo a lungo con il trattamento, possono **comparire dei forti dolori**. Come conseguenza, secondo le circostanze, si può incorrere in difficili **trattamenti alla radice** o addirittura all'**estrazione del dente**.
- **La perdita dei denti ha delle conseguenze negative sull'aspetto** (estetica/perdita dell'osso mascellare).

Altre conseguenze possibili:

- Disturbi del funzionamento della mascella, **dolori articolari**, disturbi della funzione della parola
- **Spostamento dei denti** negli spazi con possibili **disturbi funzionali**
- **Formazione di ascessi** con grave infezione locale e generale, in casi estremi con pericolo di vita
- **Danni** ad altri **organi** per esempio cuore, reni, polmoni, occhi ecc.



Fate un controllo odontoiatrico tempestivo per voi o per i vostri figli. Non minacciate i vostri figli con i brutti dolori che il dentista infligge con il trapano, ma aiutateli a vincere la paura.



La maniera migliore per sfuggire a tutti questi fastidi, è sempre la profilassi con l'alimentazione povera di zuccheri, la buona igiene orale e la fluorizzazione regolare.

Questo foglio d'istruzioni, si può ritirare gratuitamente all'indirizzo suindicato.