



Schulzahnärztlicher Dienst

Por qué han de tratarse las enfermedades de los dientes (caries)

En muchos casos las caries en los dientes (dientes picados) son sólo detectables por el dentista y, a menudo, por medio de una radiografía. Cuando un profano ve un “agujero” ya es, por lo general, demasiado tarde. Por eso se recomienda acudir al dentista al menos una vez al año para hacerse un reconocimiento.

Gesundheitsdepartement
Davidstrasse 27
9001 St.Gallen
T 058 229 43 82
F 058 229 35 52
gesundheitsvorsorge@sg.ch
www.gesundheit.sg.ch

Consecuencias de no tratar debidamente los dientes:

Dientes de leche

- Los dientes de leche deteriorados pueden causar fuertes dolores y, en algunos casos, afectar gravemente a la calidad de vida (insomnio, etc.).
- Los dientes de leche dañados pueden causar graves **abscesos** (focos purulentos), acompañados de fiebre e incluso **perjudicar a otros órganos del cuerpo**. En parte puede ser necesaria la estancia en un hospital y, en caso extremo, poner en peligro la vida.
- La pérdida temprana de los dientes de leche conlleva una **alteración del crecimiento de los huesos** del maxilar. Los dientes vecinos se desplazan hacia los espacios vacíos y no se deja el paso a los dientes permanentes. En lo sucesivo será necesario realizar costosas **operaciones o tratamientos maxilofaciales** (aparatos de corrección).

Dientes permanentes

- Para evitar „agujeros“ se pueden colocar **sellantes** en las superficies dentales.
- Cuanto **más pequeño** sea el „agujero“, **más fácil y económico** es tratarlo. Con ello el diente puede aguantar durante más tiempo.
- Si se espera demasiado tiempo para empezar un tratamiento, pueden aparecer **intensos dolores** y también por lo tanto costosos **tratamientos de las raíces** o incluso la **extracción** del diente.
- **La pérdida de los dientes tienen consecuencias negativas para el aspecto** (estética/regresión del hueso maxilar).

Otras posibles consecuencias:

- Trastornos en el maxilar, **dolor en la articulación**, disfunción del habla.
- **Desplazamiento de los dientes** hacia los espacios libres con posibles **trastornos funcionales**.
- **Formación de abscesos** con graves infecciones locales y generales, pudiendo peligrar la vida en casos extremos.
- **Daños en otros órganos del cuerpo**, por ejemplo, el corazón, los riñones, pulmones, ojos, etc.



Póngase Vd. mismo o a su hijo a tiempo en tratamiento dental. No amenace a su hijo con los dolores que le puede causar el torno del dentista, sino ayúdelo a vencer el miedo.



El mejor camino para evitar todas estas incomodidades es la prevención mediante una alimentación pobre en azúcar, una buena higiene dental y una fluoración periódica.

Este folleto informativo se puede adquirir en la dirección arriba mencionada.