



Kantonsapotheke

Verzeichnis der ohne ärztliche Verordnung anzuwendenden Arzneimittel durch die Hebammen

Der Kantonsapotheker genehmigt aufgrund Art. 52 Verordnung über die Arzneimittel [SR 812.212.21; abgekürzt VAM] die nachfolgend aufgeführten Arzneimittel. Hebammen, die über eine Bewilligung zur selbständigen Berufsausübung verfügen, dürfen die Arzneimittel dieser Liste ohne ärztliche Verordnung **anwenden**.

www.kantonsapotheke.sg.ch

Therapeutische Gruppe	Arzneimittel	Indikation
Analgetikum	Tramadol, (z.B. Tramal®, Tramadol-Mepha®) Amp. 100mg, Supp. 100mg	Wehenschmerzen
Antihypotonikum	Ephedrin Amp. 50mg/10ml unverdünnt anwenden 50mg/ml verdünnt anwenden	Hypotonie i.v. 50mg/10ml in Schritten zu 5mg/ml
Antikonvulsivum	Diazepam (z.B. Valium®, Stesolid®-Novum) Amp. 10mg	Krampfprophylaxe bei drohender Eklampsie
Antimykotische Salben / Gels	Multilind Heilpaste®	Soorbehandlung bei Säuglingen und Müttern
	Clotrimazolium (z.B. Canesten®) Creme	
	Daktarin® Mundgel	
Desinfektionsmittel		Haut- und Schleimhautdesinfektion
Einläufe		Darmreinigung vor Geburt
Immunglobulin	Rhophylac® (300µg Anti-D-Immunglobulin)	Prophylaxe der Rhesusimmunisierung
Infusionslösungen	NaCl 0.9 %, Ringer-lactat, Glucose 5 %	Volumenersatz
	Voluven®, Hemohe® 6 %	Volumenersatz (max. 1000 ml)
	NaCl 0.9 % Kurzinfusion 100ml	als Trägerlösung
Injektionslösungen	NaCl 0.9 % Amp. 10ml	als Trägerlösung
Kortikosteroide	Methylprednisolon (Solu-Medrol® 125 mg)	schwere allergische Reaktion
Lokalanästhetikum	Lidocain 1 % Amp. 10ml	Dammschnitt, Risswunden
Spasmolytikum	Scopolaminbutylbromid (Buscopan®) Amp. 20mg, Supp. 10mg	rigider Muttermund; Achtung Tachykardie bei i.v. Gabe; deshalb keine i.v. Anwendung nach PDA, bei schweren variablen Dezelerationen im CTG und innerhalb von 30 Min. nach Gabe von Gynipral
Tokolytikum	Hexoprenalin (Gynipral®) Amp. 10mcg	Wehenüberaktivität, Nabelschnurvorfall
Uteruskontrahierende Substanzen	Oxytocin (Syntocinon®) Amp. 5 IE	zur Lösung der Nachgeburt
	Oxytocin (Syntocinon®) Nasenspray	Förderung der Milchentleerung
	Misoprostol* Tabl 200µg *off-label use, Einsatz gemäss PPH-KONSENSUS-Gruppe (D-A-Ch) 2011	800µg rectal oder peroral bei postpartaler Blutung und Uterusatonie mit 500ml Blutverlust



Therapeutische Gruppe	Arzneimittel	Indikation
Vitamin K	Phytomenadion (Konaktion® MM paediatric) Amp. 2mg	Prophylaxe von Hämorrhagien bei Neugeborenen

Genehmigt am: 06.02.2019

Kanton St.Gallen
Kantonsapotheke
(gültig ohne Unterschrift)

Version 8 vom 06.02.2019 ersetzt Version 7 vom 04.04.2018