

Pflanzenschutzwarndienst

Obstbau

>> Fachstelle Obstbau

Austrieb: Je nach Lage und Sorte sind die Äpfel und Birnen in Blüte in abgehender Blüte oder bereits abgeblüht. Die Kirschen und Zwetschgen sind je nach Lage und Sorte in Blüte, in abgehender Blüte oder bereits abgeblüht.

Feuerbrandblüteninfektionsprognose

Mit der merklichen Abkühlung entspannt sich die Situation. Das Erregerinfektionspotential sinkt in den kommenden Tagen auf 0.

Massnahmen: Den Fungizidbehandlungen Bion oder Vacciplant beimischen.

Niederstamm Kernobst

Schorf

Schorfinfektionsprognose laut Wettervorhersage

ab Montag, 15. April bis Donnerstag, 18. April.

Jona: 2 Tage mit Infektion
Wil: 2 Tage mit Infektion
Flawil: 1 Tag mit Infektion
Hägenschwil: 2 Tage mit Infektion
Berg: 2 Tage mit Infektion
Berneck: 1 Tag mit Infektion
Grabs: 1 Tag mit Infektion
Bad Ragaz: 1 Tag mit Infektion

Die jetzt einsetzenden Niederschläge werden einen Ascosporenausstoss auslösen und Infektionen auslösen. In die Blüte Anilinopyrimidine wie Chorus, Frupica, Espyro, Pyrus, Papyrus in Kombination mit einem Kontaktfungizid wie Captan, Folpet, Delan, Atollan, Legan oder Rucolan und Netzschwefel zusetzen mit gleichzeitiger Wirkung gegen Schorf, Mehltau, Monilia und Kelchfäule. Folpet ist bei Birnen nicht zugelassen.

Pflaumensägewespen

Weisse Leimfallen sofort nach der Blüte auszählen. Die Schadensschwelle liegt bei 80-100 Wespen pro Falle. Eine allfällige Bekämpfung sofort nach der Blüte durchführen: Mittelwahl: Gazelle SG oder Oryx Pro, Pistol mit gleichzeitiger Wirkung gegen die Grüne Zwetschgenlaus. Gegen Schrotschuss Captan oder Delan, Atollan, Legan, Rucolan zusetzen. Gegen Rostmilben 4 kg Netzschwefel pro ha beimischen

Apfelsägewespen

Mit einer Bekämpfung bis Ende der Blüte zuwarten.

Pflaumenwickler: Verwirrungstechnik

Die Dispenser sollten montiert sein.

Äpfel (Hochstämme Feldobstbau)

Eine weitere Behandlung gegen Schorf und Mehltau ist nach der Blüte zu applizieren.

Kirschen und Zwetschgen Monilia, Schrotschuss (Kulturen und Hochstämme)

Behandlungen in die Blüte vornehmen, je nach Witterung 1-2 Behandlungen. Mittelwahl ein SSH Präparat in Kombination mit Delan, Atollan, Legan, Rucolan oder Captan mit gleichzeitiger Wirkung gegen Schrotschuss.

Hollenstein Richard
Fachstelle Obstbau

Landw. Zentrum SG
Mattenweg 11
9230 Flawil

T 058 228 24 76
richard.hollenstein@sg.ch
www.lzsg.ch