

# Pflanzenschutzwarndienst

## Obstbau

---

>> Fachstelle Obstbau

### **Niederstamm Kernobst** **Schorf**

In den nächsten Tagen, wo noch nicht erfolgt, eine Schorffkontrolle vornehmen. In schorffreien Parzellen im Vorsommer SSH-Präparate oder Strobilurine in Kombination mit einem Kontaktfungizid wie Delan, Atollan, Legan, Rucolan oder Captan einsetzen mit gleichzeitiger Wirkung gegen Schorf und Mehltau. Ebenfalls möglich sind Kontaktfungizide gegen Schorf in Kombination mit einem spezifischen Mehltaumittel wie Nimrod, Pican, Cidely oder Topas, Topas Vino. In Anlagen mit Schorfbefall nur Kontaktfungizide im Abstand von ca. 8-10 Tagen verwenden.

### **Apfelwickler Niederstammanlagen**

Eine erste Behandlung sollte erfolgt sein.

### **Kleiner Fruchtwickler**

Der Flug, die Eiablage und der Larvenschlupf haben eingesetzt. Wo noch nicht erfolgt, jetzt Behandlung sofort vornehmen. Mittelwahl: Affirm, Atac, Rapid, Audienz oder Elvis mit gleichzeitiger Wirkung gegen den Apfelwickler.

### **Grüne Apfelblattlaus**

Kulturen, insbesondere Junganlagen, laufend überwachen. Bei Überschreiten der Schadenschwelle von 5-10% befallenen Langtrieben eine Behandlung vornehmen. Mittelwahl: Pirimor, Teppeki.

### **Kirschen (Kulturen und Hochstämme) Fruchtmonilia, Bitterfäule**

Vor der Ernte sind bei Kirschen je nach Witterung 1-2 Behandlungen gegen die Fruchtmonilia und die Bitterfäule zu applizieren. Mittelwahl: Teldor+Delan, Prolectus+Delan oder Flint+Moon Privilege. Wartefristen beachten. Zur Vermeidung von Spritzflecken nur trockene Bäume behandeln. Bezüglich Mischbarkeit der Produkte mit Insektiziden stets Gebrauchsanweisung beachten.

### **Kirschenfruchtfliegenbekämpfung**

Eine 1. Behandlung ist ca. eine Woche vor Farbumschlag beim Gelbwerden der Früchte um die 4 Wochen vor der Ernte durchzuführen, eine 2. Behandlung 2 Wochen vor der Ernte. Mittelwahl: Gazelle, Oryx Pro, Pistol, Barritus Rex, Movento SC.

Wartefristen: für alle oben genannten Mittel: 2 Wochen

Die genannten Mittel haben auch eine Wirkung auf die Schwarze Kirschenlaus. Bezüglich Mischbarkeit der Produkte mit den obengenannten Fungiziden stets Gebrauchsanweisung beachten.

### **Kirschessigfliege**

7 Tage vor der Ernte ist eine Behandlung mit Audienz vorzusehen.

### **Zwetschgen: Zwetschgenrost**

Ab anfangs Juni sind bei Zwetschgen 2 Behandlungen gegen Zwetschgenrost im Abstand von ca. 14 Tagen zu applizieren. Mittelwahl: Delan + Netzschwefel. Netzschwefel nicht bei heissen Temperaturen über 25°C anwenden.

### **Pflaumenwickler**

Für eine Bekämpfung der 2. Generation ist es noch zu früh.

### **Äpfel (Hochstämme Feldobstbau) Schorf, Mehltau, Apfelwickler**

Eine weitere Behandlung gegen Schorf und Mehltau mit SSH- oder SDHI-Präparaten oder mit Strobilurinen ist zusammen mit der Apfelwicklerbekämpfung durchzuführen. Zeitpunkt der Apfelwicklerbekämpfung: Je nach Lage um den 2. bis 10. Juni., wo noch nicht erfolgt bitte sofort nachholen. Mittelwahl: Zorro.

Zu beachten: Allfällige Auflagen bezüglich der Mittelwahl und Einsatzzeitpunkt der Mittel von Handelsbetrieben sind zu beachten.

Hollenstein Richard  
Fachstelle Obstbau

Landw. Zentrum SG  
Mattenweg 11  
9230 Flawil

T 058 228 24 76  
richard.hollenstein@sg.ch  
www.lzsg.ch